

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES COM ESTOMA INTESTINAL

¹NOGUEIRA, DANIELE PEIXOTO

²SANTANA, ADRIANA CRISTINA

³GONÇALVES, ODILENE

⁴PACHECO, SIMONE DOS ANJOS CAIXETA

¹Graduanda do Curso de Enfermagem do Centro Universitário de Patos de Minas e bolsista voluntária do XVI Programa Institucional de Iniciação Científica

²⁻³ Centro Universitário de Patos de Minas

⁴ Centro de Reabilitação Totó Veloso

O estoma intestinal é uma abertura confeccionada cirurgicamente com a finalidade de facilitar a comunicação interna do órgão com o meio exterior e suprir a função afetada de eliminação de excretas. O objetivo deste estudo foi caracterizar o perfil dos pacientes ostomizados com intuito de planejar de forma integral a assistência de enfermagem a estes pacientes. Trata-se de um estudo exploratório, descritivo e quantitativo, realizado através da aplicação de um instrumento de coleta de dados contendo informações sobre as características sociodemográficas, etiologia e necessidades psicossociobiológicas afetadas. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM sob CAAE: CAAE: 40788514.5.0000.5549. A amostra foi composta por 51 pacientes, o gênero masculino foi o mais frequente com 39 (56,9%) dos pacientes. A idade variou de 18 a 92 anos, com mediana de 65 anos e média de 61,8 anos (DP $\pm 16,3$), houve predomínio dos pacientes casados 27 (52,9%), a maioria dos pacientes são aposentados 36 (70,6%) e 11 (21,6%) estão afastados das atividades laborais, a renda familiar predominou com o valor de um a três salários mínimos com 35 (68,6%) e o grau de escolaridade mais frequente foi até 7º série do ensino fundamental 34(66,7%) pacientes. A necessidade humana básica de realização das atividades diárias e de cuidados com a higiene corporal esteve afetada em 17 (33,3%) pacientes respectivamente, incluindo a necessidade de vestir-se e arrumar-se em 13 (25,5%), 16 (31,4%) pacientes evitam relacionar de forma amorosa e 14 (27,5%) evita relacionar-se com a família, parentes e amigos. Aproximadamente metade da população 24 (47,1%) referiu perda de peso após a realização do procedimento cirúrgico de criação do estoma intestinal para eliminação. Conclui-se que o enfermeiro tem um papel importante incentivando o paciente ao retorno das atividades de vida diária, atividades laborais e convívio social. Existem alterações em parcela da população estudada em relação às necessidades psicobiológicas de realização das atividades diárias, cuidado corporal, movimentar-se, vestir e arrumar-se. As necessidades psicossociais de amor e gregária estão afetadas na população dificultando o convívio social cabendo à enfermagem planejar uma assistência de enfermagem integral e holística.

Área de saúde: Enfermagem