

A INCIDÊNCIA DE ÓBITOS POR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO EM 2013 NO ESTADO DE MINAS GERAIS

BELARMINO, Ana Carolina Barbosa¹; REIS, Juliana Ribeiro Gouveia²;

¹ Discente do 10º período do curso de fisioterapia do Unipam; ² Docente Mestre em Promoção de Saúde e especialista em Fisioterapia Cardiorrespiratória.

E-mail: carol_sg25@hotmail.com; julianargr@unipam.edu.br

O Infarto Agudo do Miocárdio é a limitação do fluxo sanguíneo de grande magnitude, o que leva à necrose do músculo cardíaco devido a aterosclerose, outras etiologias incluem o vasoespasm, suprimimento de oxigênio diminuído ou aumentado demasiadamente. Dentre os fatores de risco não modificáveis, associados ao desenvolvimento das doenças cardiovasculares estão a idade acima de 55 anos, histórico familiar e sexo masculino dentre outros. Os fatores de risco modificáveis incluem a Dislipidemia (DLP), tabagismo, Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), sedentarismo, obesidade, Diabetes Mellitus (DM), dietas não saudáveis e estresse psicossocial. Analisar a incidência de óbitos por infarto agudo do miocárdio no estado de Minas Gerais no ano de 2013 de indivíduos de 40 a 79 anos de idade. Foi realizada a avaliação e análise exploratória do Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM, foram analisados os óbitos cuja causa básica foi infarto agudo do miocárdio ocorridos no Estado de Minas Gerais durante o ano de 2013 com indivíduos de 40 a 79 anos. No ano de 2013 houve um total de 4.831 óbitos por infarto agudo do miocárdio em Minas Gerais com indivíduos de 40 a 79 anos de idade. Dentre esses óbitos, 64% foram de indivíduos do sexo masculino e 34% do sexo feminino. Além disso, foi possível observar que a faixa etária menos acometida foi a de 40 a 49 anos 9%, seguida respectivamente pelas de 50 a 59 anos 22%, 60 a 69 anos 33% sendo a mais acometida de 70 a 79 anos correspondendo a 36% do total de óbitos. Conclui-se que dentre os óbitos ocorridos em 2013 por IAM os homens foram mais acometidos do que mulheres, e que a idade é um fator igualmente proporcional á incidência de óbitos, o que pode ser explicado pela associação de vários fatores de risco como obesidade, sedentarismo e diabetes melittus, comuns em indivíduos mais idosos.

Área temática: Fisioterapia