

RISCO DE TROMBOSE EM CONSEQUÊNCIA DO USO CONTÍNUO DE ANTICONCEPCIONAL ORAL: UM ESTUDO DE REVISÃO

BARBOSA, VANESSA DE OLIVEIRA ¹
FERREIRA, MILCE BURGOS ²

¹ Acadêmica do curso de Enfermagem - Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM.

² Enfermeira, Mestre em Promoção de Saúde pela Universidade de Franca, Professora atuante no Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM

INTRODUÇÃO: Os contraceptivos são métodos utilizados em mais de 100 milhões de mulheres em todo mundo, sendo os mais apontados em formas de pílulas. Os hormônios contidos nesses medicamentos são o etilestradiol e ciproterona ou drospirenona que reproduzem os mesmos efeitos do estrogênio e progesterona. A utilização do anticoncepcional aumenta de três a cinco vezes o aparecimento de manifestações tromboembólicas. A trombose venosa profunda (TVP) é uma doença comum que interrompe o fluxo sanguíneo devido à formação de um coágulo ou trombo podendo originar de fatores adquiridos, hereditários ou devido ao uso prolongado de hormônios femininos. **OBJETIVOS:** Salientar a relação dos contraceptivos hormonais orais com o surgimento de trombose, que é uma complicação frequente e que causa grandes impactos. Um maior conhecimento deste assunto por parte das pacientes e profissionais de saúde é de extrema importância, uma vez que a maioria delas não tem ciência dessa possível complicação. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa, que é um método de pesquisa rico em abordagem metodológica, onde permite a integração de estudos experimentais e não experimentais para um entendimento mais amplo do caso explorado. Foram utilizadas as publicações disponíveis, dissertações, teses e artigos científicos. As bases de dados explorados foram: biblioteca eletrônica Scientific Electronic Library Online (SciELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e site acadêmico. Usaram-se as palavras chaves para realizar a busca: trombose, risco do uso contínuo de contraceptivos, anticoncepcionais e trombose, trombose e enfermagem. **RESULTADOS:** Os dados analisados mostraram que a causa de trombose venosa em mulheres que fazem uso contínuo desse medicamento está fortemente vinculada à dose de estrogênio presente neste método e demais fatores predispostos. Embora os riscos que os usos dos anticoncepcionais orais apresentam seus benefícios ainda são maiores, uma vez que dispõe de grande eficácia contraceptiva, é reversível, possui acesso fácil e tem grande importância para o planejamento familiar. **CONCLUSÃO:** Esta revisão possibilitou mostrar que a trombose é uma patologia que pode aparecer por diversos fatores, a genética é tem uma parcela influente nesse processo. Os contraceptivos orais apresentam estar correlacionados com a hipercoagulabilidade, pois esses fármacos podem estimular modificações no sistema hemostático ocasionando a trombose, principalmente aqueles com alta dosagem estrogênio que além de elevar os fatores de coagulação diminui os anticoagulantes naturais.

ÁREA TEMÁTICA: Enfermagem.